

### Tipus d'Insulina

TIPUS		MARCA	INICI DE L'EFECTE	MÀXIM EFECTE	DURADA DE L'EFECTE
<b>RÀPIDA</b>		Humulina®regular vial	30 m	1-3 h	5-7 h
		Actrapid® vial, Innolet	30 m	1-3 h	8 h
<b>ULTRARÀPIDA</b>	LISPRO	Humalog®vial, Kwik Pen	15 m	30-70 m	Fins a 5 h
	ASPART	Novorapid® Flexpen	10-20 m	1-3 h	3-5 h
	GLULISINA	Apidra® Solostar	10-20 m	1-2 h	3-4 h
<b>INTERMITJA</b>	NPH	Humulina®NPH vial	1h	2-8 h	18-20 h
		Insulatard® vial, Flexpen	1'5 h	4-12 h	24 h
<b>MESCLES</b>	30% RÀPIDA 70% NPH	Mixtard 30® Innolet	30 m	2-8 h	24 h
	25% LISPRO 75% NPL	Humalog® Mix 25 Kwik Pen	15 m	30-70 m	15 h
	50% LISPRO 50% NPL	Humalog® Mix 50 Kwik Pen	15 m	30-70 m	15 h
	30% ASPART 70% NPH	Novomix® 30 Flexpen	10-20 m	1-4 h	24 h
	50% ASPART 50% NPH	Novomix® 50 Flexpen	10-20 m	1-4 h	14-24 h
	70% ASPART 50% NPH	Novomix® 70 Flexpen	10-20 m	1-4 h	14-24 h
<b>BASALS</b>	GLARGINA	Lantus® Optiset, Solostar	1-2 h	sense pic	24 h
	DETEMIR	Levemir® Flexpen, Innolet	Durada de l'acció fins a 24 h en funció de la dosi		
	NPL	Humalog® Basal Kwik Pen	1-2 h	4-8 h	18-24 h